## 庫全書

子部

欽定四庫全書

關臺軟範卷七

洗馬臣王坦修覆勘 總校官無古士臣何思釣 校對官學正臣湯

腾绿聚人臣蔡枝華

垣

詳校官太醫院院使臣張肇基

たろうりまたいまする 相染者正氣存內那不可干避其毒氣天化從來大 重禄 城下 松原如何可得不相移易者收伯曰余用五変之至皆相染易無問大 閱麦執乾 吳江徐大椿撰

青氣自肝而出左行於東化作林木次想白氣自肺而 黃氣自脾而出存於中央化作土五氣該身已畢以想 出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上 日日未出而吐之又一法於雨水日後三浴以樂泄汗 頭上如北斗之惶惶然後可入於疫室又一法於春分之 化作焰明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次想 不那干氣出於腦即先想心如日欲將入於疫室先想 之氣故曰天北欲其來往出入復得其性氣出於腦即內無注云鼻也空虚能受天地復得其性氣出於腦即


**悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脈緊大而浮者** 散則民多疾疫無長少至皆相似如有鬼属故云疫癘 浮族如疾者生 無多者多係中惡莫作吐血治 ここうこうこうこう 死緊細而浮者生 又中惡吐血數升脈沉數細者死 **藏之內節原不和寒暑乗候或有暴風疾雨霧露** 慈 精神衰弱為思神之氣卒中之卒然心腹刺痛 陰陽逆也其狀如死循微有息而不恒脈尚動 目上見色 卒然吐

思擊 多次四年全書一 中出血或下血一名為思排重者死 愈若唇青身冷此為入臟即死 而形無知也脈沉大而滑身温而汗此為入腑氣復自 不忌火 則神魂遂不復入乃死若在燈光前魔者是本山明出 矛持刺狀胸脇腹内絞急切痛不可抑按或吐血或鼻 魂魄外遊為他那所執欲還未得忌火照之照 謂思薦之氣擊者於人也得之無漸如人以刀


治之者故名諸尸也 通常接引外邪為人患害其發作之狀或沉沉默默不 頓滯以至於死死後復易旁人乃至滅門以其尸病注 腰脊或精神裸錯變狀多端其病大同小異但以一方 知所苦而無處不惡或腹痛脹急或碾塊踊起或擊引 シェンマー・ノンニョー 三尸諸蟲 人無處不惡每節氣改變輒至大惡積月累年漸就 是五尸内之尸注而挟外思邪之氣流注身體 其虫與人俱生而此虫是血能與思靈相 問委仇乾

易豪人故曰尸注 多 好 四 库 全書 其身內尸由性既忌惡便更接引外那共為疹病其發 亦心腹刺痛脹湍氣急但逢喪處其病則發故謂之 故謂之尸氣 相接成病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但聞尸氣則發 氣 人有年命衰弱至於喪死之處心意有所畏惡 人有觸值死尸或臨尸其尸氣入腹內與尸虫

及との事を与る 日凉注 骨血温輝勞微泄石產上飲以上諸注皆正氣虚而那 思轉住死邪氣寒熱冷蟲毒惡作道走温喪哭殃食水 氣傳綿也與諸尸病相近 乃有三十六種九十九種而方皆不顯其名所載有風 日風注 又有九種注 謂邪氣居住人身內故名為注又注易旁人也 六日酒注 二日寒注 随士生軟乳 七回食注 三日氣注 八日水注 四日生注 九日 五



次七日年七日 還魂湯食賣救卒死客午死 煉白沙蜜為九如梧子大每日望東吸日華氣一口 者分病人髮左右足踏局引之樂下復增取一升頹 右三味水八升煮取三升去渣分令咽之通治諸感 麻黄三兩去節在仁去皮尖十草一兩象千金 氷水下一九和氣咽之服十粒無疫干也 復覺或已無脈口禁拗不開去齒下湯湯入口不下 千金方云此方主卒忤思擊飛尸諸奄忽氣絕 蘭慶執乾



交色日月八十 雄黄粉弄金治卒中思擊及刀兵所傷血漏腹中不出 治瘟方外臺瘟疫轉相染著至減門延及外人無収視 者 煩滿欲絕 赤小豆 雄黄一味為粉以酒服一刀圭日三血化為水 當下老小量之 右二味以綿纏搥令碎熟湯二合捻取自然汁飲之 7 思箭羽 蘭臺軌範 鬼臼 雄黄研

金写中屋有書 辟瘟殺鬼九外產 虎頭骨五兩株砂一兩思白 雨各二 右五味捣木蜜丸如小豆大服一丸 可與病人同狀 物 右家中置屋四角月朔望夜半中庭焼一九忌生血 右七味搗節以蠟蜜和彈九大絲囊盛繁精男左女 我此黄一两燕夷一两 兩雄黃牛研皂炭

諸疸門黄汗 紫金錠 というらいたり 平人氣象論弱黃赤安即者黃疸已食如饑者胃疸目 八妻亦九蜜鑑治思疾病 丹皮 雄黄 服五七九冷水送下無時整石或 素問 礬石 巴豆兩一 蘇合九二方俱 · 蜈蚣一條為末蜜九小豆大每 蘭臺甄範 硃砂 附子泡 黎蓝 Ł

多好四月全書 医 一穀疸額上黑微汗出手足中熱海暮即發膀胱急小便 黄者曰黄疸 自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中懊憹而熱不能 氣下流小便不通陰被其寒熱流膀脫身體盡黃名曰 緊為傷脾風寒相搏食殼即眩殼氣不消胃中苦濁濁 趺陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為 縣亦當寒熟策領古方可考也尺脈浮為傷野跌陽脈緊而數則有熟策有寒故用尺脈浮為傷野跌陽 金匮

改定四車全書 一 愈 治發於陰部其人必嘔陽部其人振寒而發熟也 劇為難治 食時欲吐名曰酒疸 狀大便正黑皮膚爪之不仁脈浮弱雖黑微黄故知之 心中熟足下熟是其證也 酒疸心中熟欲吐者吐之 告家從濕得之一身盡發熱面黃肚熟熟在裏當下 黃疸之病當以十八日為期治之十日以上強反 酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如噉蒜養 疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可 夫病酒黄疸必小便不利其候 蘭臺朝氣

黄病 無汗腰脆弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼痛 常暮即盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熟者久久 **烔燥小便不利此為黄汗** 輕者久久必身關贈即胸中痛又從腰以下必汗出下 其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒 汗之病兩脛自冷假今發熱此屬歷節食己汗出又身 病源 黄病者一身盡疼發熱面色洞黄七八日後壮

急黄 熱口裏有血當下之法如純肝狀其人少腹內急若其 次王四華全書 圖 黄心满氟喘命在順刻故云急黄也 皆變黃也利亦便為 熱與宿穀相搏煩鬱不消則大小便不通故身體面目 腹脹不存此由寒濕在表則熱蓄於脾胃腠理不開瘀 根精湿疼身骨疼两膊及項強腰背急即是患黄多 (便涩但令得小便快即不處死不用大便多多即心 **脾黃有熱穀氣鬱蒸因為熱毒所加故猝然發** 蘭臺軌範

勞黃 陰黄 腦 腦黄 金ガルラ 黑微汗出手足中熱薄暮發膀胱急四肢煩小便自利 癖 名為勞黃 則身體發黃頭痛眉疼 黄 不發熱名為陰黃 陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛 熱邪在骨髓腦為髓海故熱氣從骨髓流 脾臟中風風與於熱相搏故令身體發黃額 氣水飲停滯結聚成癖因熟氣相轉則鬱然不 1: 1

噤黄 散故脇下满痛而身發黃名為癖黃 大工司和一十十十二 脈近掌三指道有如不絕其人必不死 **岐脈看時若肝脈全無兩廂壞其人九死一生若中** 肘前臂上當有三岐脈中央者名為手肝脈兩廂者名 左手脈名手肝脈两筋中其脈如有如無又看近手屈 身面發黃舌下大脈起青黑色舌噤不能語名為噤黃 五色黄 凡人者五種黄其人冥漢不知東西者看其 心脾有疾熱心主於舌脾之絡脈出於舌下若 蘭臺軌範

赤斑 當風入水則身目發黃心中惧痛足腔滿小便黃面發 金月四月月十二 酒疸 由大勞大熱而交接即入水所致也 女梦洹 失饑大食胃氣衝熏所致 穀疸之狀食畢頭財心松佛鬱不安而發黃由 虚勞之人飲酒多進穀少則胃內生熱因大醉 思祖之狀小腹滿身體盡黃額上及黑足下 其狀身目皆黄發熱惡寒小腹滿急小便難

首陳舊湯金 · 截桓之為病寒熱不食食即頭肢心胸 黃汗之為病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染 大便里是也諸疸久久多變為黑疸 人かり見から 衣正黄如蘗汁其脈自沉此由脾胃有熱汗出而入水 首陳舊六兩梔子村四大黄二兩 不安久久發黃為穀疸此湯主之 浴若水入汗乳中得成黄汗也 諸疸方 湖產軌節

消石攀石散全置黄家日脯所發熱而反惡寒此為女 勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作 黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非 右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三 升去浑分温三服小便當利尿如皂角汁狀色正亦 水也腹滿者難治此方主之 宿腹減黄從小便去也 礬石烷等

次至四華全勢 图 桂枝如黄茂湯金屬諸病黄家但利其小便假令脈浮 栀子大黄湯食園酒黄疸心中懊懷或熱痛此方主之 當以汗解之此方主之 亦主治黄汗 栀子十四大黄一两枳實五枚致一升 右二味為散以大麥粥汁和服方寸七日三服病隨 右四味以水六升煮取二升分温三服 大小便去小便正黄大便正黑是候也 ら 楽 蘭臺軌範 甘草為二生薑三两大聚十二

首陳五苓散金置黃疸主之 猪膏髮煎食過踏黄主之 有り下げんごう 黄茂二两 格膏中所髮如雞子 粥一升餘以助藥力温覆取微汗不汗更服 右六味以水八升煮取三升温服一升須臾飲熱稀 茵陳膏末一錢五苓散五分 右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

炎足四重全馬一 大黃消石湯金黃黃疸腹滿小便不利而亦自汗出此 **承黄醇酒湯干食治黄疸** 麻黄 "两以美清酒五升煮取二升半 現服 黄疸愛腹滿者最 為表和裏實當下之 右四味以水六升煮取二升去渣內消更煮取一 右二味和先食飲方寸七日三服此利小 大黄 番檗 嚴空軌範 消石為四桅子大五 頻服盡冬月 1

黃疸方章金治身目皆黄皮肉麹塵出 赤容散弄金主思追身皮大便皆黑 イランドノノニー 茵陳一把栀子四枚石膏一斤以水五升煮二升取 用酒春月用水 赤小豆在十次冬六鉢雄黄一练瓜丁四鉄女美六 升覆取汗局身以粉粉之不汗更服燒石膏之 稣甘草 严 錄以水三升煮豆茯苓取八合搗內味為 一升半去渣以猛火烧石膏令亦投湯中沸定服

寒水石散弄金主肉疸飲少小便多白如油色此病得 の人とり事ととう 女勞疸華食治黃疸之為病日晡所發熱惡寒少腹急 寒水石 之從酒 散和半錢服之須與當吐吐則愈亦主一切黃 體黃額黑大便黑溏洩足下熱此為女勞也腹滿者 五日知十日差聊備一格 桂心分二為節為散麥粥服五分七日三服 白石脂 蘭臺軌範 括姜洛五知母 十四 兔絲

牛胆煎其食酒戶身黃題歷出此主之 重写 巴居有量 滑石研 難療 牛胆微火煎令可充丸如豆大服一服日移六七日 右三味以酒一升切三味漬之一宿煮減半去渣內 牛胆「妆大黄八两光花一升光花繁斤 便極利差 不知更服一丸膈上吐膈下痢或不吐痢而愈 石膏两為散麥粥汁服方寸七日三小 卷上

療黄疸方外臺 欠とりは ニトラー 近效瓜蒂散外臺療黃疸 松急三十種黄方外産 日便愈無小麥苗礦麥苗亦得 身體眼暗極黃者不過三顆鼻中虫出神效 取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四 用雞子一顆分殼焼灰研酢一合又温之總和頓服 大大小豆之枚生林米上人丁香女人 蘭喜歌範 古五

金月日月全書 麻黃連軺赤小豆湯傷寒治傷寒疾熱在裏身必發黄 此主之 竹筒極力吹鼻中無不死者有此法或用長腰前蘆 病輕者小豆大則可不愈問日復頻用效或使人以 右四味搗篩重者取如大豆二枚各著一枚鼻乳中 許吹鼻亦能出水內白膜研細加扇少 痛縮鼻須與鼻中瀝清黃水或從口中出升餘則愈 麻黄二兩連軺二兩赤小豆一升杏仁物十十草

交色写事主旨 一 黃武 等接枝若酒湯金 黄汗之為病身體腫發熱 右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升温服 黄茂五两芍樂三兩桂枝三兩 右以潦一斗先煮麻黄去沫內諸樂煮取三升分温 以汗出入水中浴水從汗孔入得之此湯主之 汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黄如蘇汁脈自沉 兩生梓白皮一升生薑二兩大聚十二 三股此方治傷寒餘邪未 随臺毗範

阻故也一方以美生鹽代苦酒 情志卧夢 金ガスセコアノニー 升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以告 建中湯見通瓜蒂湯对見 靈素 單出腹非

者五臟六腑之精也管衛魂魄之所常管神氣之所生 精所中不相比也則精散精散則視歧視歧見兩物目 其軍氣之精為白眼肌肉之精為約束表摘筋骨血氣 腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪同其精其 項因逢其身之虚其入深則隨眼系以入於腦則腦轉 之軍為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為終 靈大惑論五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精精 之精而與脈分為系上屬於腦後出於項中故邪中於

次已四年上野一

蘭達朝範

ナ

怒怒傷肝悲勝怒所勝即五行南方生熱在聲為笑在 也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白 則氣收見則氣泄舊則氣亂勞則氣耗思則氣結 生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下 心者神之舍也故精神亂而不轉卒然見非常處精神 眼赤脈法於陽也故陰陽合傳而精明也目者心使也 陽氣象大論東方生風在聲為呼在變動為握在志為 魂魄散不相得故曰惑也 素舉痛論帝曰余知百病 卷上 陰

聲為哭在變動為欬在志為憂憂傷肺喜勝憂北方生 改定四軍全書一 汗於下氣并於上亂而善忘 情志 調經論神有餘則笑不体神不足則悲血有餘則怒不 寒在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎思勝恐 歌在變動為壞在志為思思傷脾怒勝思西方生帰在 變動為憂在志為喜喜傷心恐勝喜中央生濕在聲為 **弁於陰乃為艮中血弁於上氣弁於下心煩悅善怒血** 足則恐 血并於陰氣并於陽故為舊在血并於陽氣 蘭臺軌範

注之於脈化以為血以紫四末內注五臟六腑以應刻 中出於喉嚨以贯心脈而行呼吸馬榮氣者必其津液 不即多卧 膚之間而不体者也畫日行於陽夜行於陰帶從足少 數馬衛氣者出其悍氣之懷疾而先行於四末分內皮 入於胃也其糟粕津液宗氣分為三陵故宗氣積於胸 人也或令人目不順不即出者何氣使然怕高曰五穀 1分間行於五臟六腑今厥氣容於五臟六腑則衛 靈邪容篇黃帝問於伯高曰夫邪氣之客 一段定四車全書一 卒然多即者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉 其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其即立至 而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多 腸胃大而皮膚濕而分內不解馬善食人多善帝曰 氣威則陽蹻陷不得入於陰陰虚故目不順黃帝曰善 氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣或陽 治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虚實以通 大惑論黄帝曰人之多即者何氣使然政伯曰此人 蘭臺帆宛

卧馬 頫 常故書精而夜順老者之氣血衰其肌肉枯氣道濟五 **腹者何氣使然少壯之人不畫腹者何氣使然歧伯答** 臟之氣相搏其禁氣衰少而衛氣內伐故畫不精夜 回肚者之氣血或其肌肉滑氣道通禁衛之行不失其 寒熱病篇陽氣盛則瞋目陰氣盛則順目 素逆調論不得即而息有音者是陽明之 靈管衛生會篇黃帝曰老人之不夜

を京多即 経 京多即 息有音也夫不得即即明尚者是水氣之客也夫水者 循津液而流也腎者水臟主津液主即與喘也以上即 故不得即也下經曰胃不和則即不安此之謂也夫 也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃 居如故而息有音者此肺之絡脈逆也絡脈不得隨經 脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道 上下故留經而不行絡脈之病人也微故起居如故而 人於陰 蘭臺軌節

傷以上 夢恐懼哭泣飛揚心氣或則夢喜笑恐畏脾氣或則夢 大火燔始陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢 素脈要精微論短出多則夢聚眾長出多則夢相學毀 **瓊甚錢則夢取甚飽則夢予肝氣盛則夢怒肺氣盛則** 靈淫邪發夢篇陰氣虱則夢涉大水而恐懼陽威則夢 歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬 情志即夢方


次王四年上十二 半夏秫米湯雪樞以流水干里以外者八升揚之萬遍 半夏麻黄九金匮心下悸者此主之 右二味末之煉蜜九小豆大飲服三九日三此治 半夏 夏五合徐炊令竭為一升半去其浑飲汁一小杯目 已矣久者三飲而已也漢時一斗僅今二升余親 取其清五升者之炊以革新火沸置秫米一升治半 二稍增以知為度故其病新發者覆林則即汗出則 麻黄等分 蘭臺軌範 Ŧ

黃連阿膠湯傷寒治少陰病心中煩不得即 桂枝枚近湯金匱火邪者主之 自ラルカノニー 樂煮取三升去浑温服 蜀漆三兩洗大聚十二 桂枝三兩甘草二兩生薑三兩牡蠣五兩龍骨四兩 黄連四两黄谷 右七味末之以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸 两芍藥二两阿膠三兩難子黄 巻と

酸聚仁湯金匮治虚勞虚煩不得眠 ここころ こここ 酸聚仁二升甘草一两知母 腎以 氣納 盡少冷內雞子黃攬和温服七合此治腎氣沖心之 右五味以水六升先煮三物取二升去滓內阿膠烊 右五味以水八升先煮聚仁取六升內諸藥煮取三 枚 兩 朝髮地完 茯苓 Ē 川芎る

治多忘千金一一年生養已足散胆中之寒庸醫則以以熟中一味生養已足散胆中之寒庸醫則以以熟 多好四月全書 温胆湯千多治大病後虚煩不得眠此胆寒故也宜服 半夏 甘草一兩 取可採 升分温三服月一心煩不眠而用藥泡別何醫者之 竹峁 枳實為二橋皮三兩生薑內兩

鎮心省睡益智方其金 枕中方千金治好忘 龜甲矣 遠志去心 首浦ニ分茯苓 良 ; 7 右五味治下篩酒服方寸七日二夜一五日後知神 右四味治下篩酒服方寸之日三常服令人大聰 五十两盆智子 7. 1 :- : I 龍骨 衛主机範 遠志去心菖蒲等分 当浦名い 参各五速志之分 Ī



素繆刺論邪客於手陽明之絡令人耳聲時不聞音刺 刺中指爪甲上與內交者立聞其不時聞者不可刺也 手大指次指爪甲上去端如韭葉許各一有立聞不己 靈厥氣篇精脱者耳聲 耳 靈脈度篇五臟不和則七竅不通 靈素 液脱者耳數鳴

補腎治五鄰方軍多治勞龍 耳俞者 革麻仁五分杏仁 聤醇耳 **外聲耳中作聲** 病源 耳方 津液為風熱所柔結辦成九塞耳 「夫 桃仁去皮蠟八分菖蒲 然石鹽 三分附子池 通草

**设定四庫全書** 從落九濟生治腎虚耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴 肉從塔 耳一日四五度出之轉捻不過三四度日一易ご 脂及蠟合搗數干杵可丸乃止取如棗核大綿褁塞 右十二味先搗諸草石等令細別搗諸仁 兔絲子 **薫陸**香 山萸肉 笼活 分松脂二兩 關臺軌範 鹿茸 石龍的 取菜 石菖蒲 石斛 磁

磁石猪肾羹養老治老人久患耳聲養腎臟強首氣 麝香佛手散 奇效治五般耳出血水者 麝香少許人牙根過存性出火毒 以 現壓者酒調||字服之即出 石為細末每用少許吹耳內即氧及治小兒痘疹 石為末煉蜜九梧子大每服百九空心酒下或鹽湯 打碎水海 務野 一對去 脂

通耳法濟生 **發定四事全書** 豉薑椒作羹空腹食之作粥及入酒並得 痛取出 磁石 見大一 地穿山甲 桃存性為 按此症如有火者服清火藥腎度 雨即愈一方用班毛一筒巴豆一粒研細綿聚塞耳 石以水五升煮磁石取二升去磁石投腎調和以葱 (用新綿紙表了寒耳口中街少許鐵覺耳內如風 顧麦軌乳 治無定方也 文

E 者陽明病役外走者少陽病 靈論疾診尺篇診目痛亦脈從上下者太陽病從 目故見風則泣下也 日す 虚素 稍微論夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燔 一金主目皆經年不愈方 卷上 决氣篇氣脱者目不明

去間方其金 於主四華全書 图 補肝九章金 琥珀 見さ 石為細末傳目中如小豆大日三大良 石胆 等分研如粉 焼灰為末取如胡豆者醫上日耳正仰即令 主明目 一石米久乃拭之有息肉者加珍珠如貝 馬珂分名 簡臺軌氣 珊瑚 决明子 分处仁五线 芝 紫貝

磁味九機故做集治神水寬大漸散昏如霧露中行漸 桂心五分 右十四味搗篩煉蜜和九飫服如桐子大下十五九 可加至二十九慎生冷油蒜等物眼暗神方也 **魏空中有黑花覩物成二體及內障神水淡緑色淡** 大黄二兩次明子 堯絲子 盤子 **芜蔚子**各二 細辛 車前子 兩青稻子

一致定四庫全書 | 石斛夜光九 黑花都物成二神水淡緑淡白色者 服十九加至三十九空心米湯下 右三味更以一兩水和作舒煮浮入煎藥煉蜜九每 磁石二兩辰砂一两神親三两 大門冬二兩兔絲子七錢人參 白色及治耳鳴及聲 山樂 治神水寬大漸散昏如霧露空中 一篇 麦乳節 石斛 茯苓西二甘前 杏仁我と草次

終年角散 局方治風熱毒上衝眼目暴發赤腫或生 봬 七錢 青稻子 九温酒鹽湯送下眼科樂不 炙 右二十四味為細末煉蜜克如桐子大毎服三十五 疼痛隱涩羞明 黄連 防風 枳殼 生地雨 川営 肉從答 甘草

**欽定四車全書** ₹ 與花散 局方治肝經熟熟風毒上攻眼目翳膜遮睛赤 草决明炒 服 腫疼痛昏暗視物不明隱滋難開多生夥淚內外 兒亦可服五分 麻為二次明子四枚草龍胆去蘆山梔仁兩五 羚羊角劈 石為細木每服一錢食後温熟水調下日進三服 甘菊花 車前子 蘭麦帆乾 川芎不見蟬退洗去山 黄芩 主

眼樂養老 胆礬 許調服亦得食後及臨即時服此去翳 石為末毎服二錢用茶清詢服或用荆芥湯入 蒺藜刺去甘草分等 石四味每用一字湯泡候温閉目洗兩皆頭以冷為 不賊草 去火毒用 滑石研一两服令白滑石 穀精草 **羗活不見荆芥** 防風不見黄芩去土菱荆子 老上 兩春皮半兩臟粉二錢 通治す 盛蒙花 白

身 於定四車全書 一 失也 素五臟別篇五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為 靈憂意無言篇人之鼻洞涕出不收者頑額不開 於諸内 极 九書治五病胆 靈素 取り探り込みれる人日極大人の人口極大人の人口を表した人人の人口を表した人人の人口を表した人人の人口を表した人人の人口を表した人人の人口を表した人口を表した人口を表した人口を表した人口を表した人口を表した人口を 蘭臺軌節 樂時至最 酌眼於多 用京都院外 法有 則專 當廣求 圭 眼器 分氣 科述

通草散弄金治界中息肉 不利也 者濁涕下不止也傳為的战敗目雖也故得之氣厥也 辛類鼻淵 中日三次真珠能去 右三味下篩熊鄉如聚核取藥如小豆者鄉頭內鼻 通草半雨磐石烧雨真珠一练 鼻す 素氣厥論胆移熱於腦則辛類鼻淵鼻淵 卷上

於定四車公書 理 親男方年 治身中息肉不得息 礬石烷 各二 右為細末麻油搜令硬不可爛旋九如鼻孔大小用 岩丁香 右四味各搗下篩合和以竹管取藥如小豆大內孔 中吹之以綿絮塞鼻中日再以愈為度吹不 黎蘆西 瓜蒂大比附子半雨 甘逐錢二青魚 厳臺軌範 草烏尖

凌霄花散五一治酒難身 蒼耳散 樂内身內令至持肉上每日一次 右為末每服二錢用葱茶湯食後調服 辛夷仁半兩蒼耳子銭半香白芷一兩海荷五分 凌霄花 右為末每服二錢食後茶湯調下 治鼻流涕不止名曰鼻淵 山栀等分

改定四事至書 えす スす 身中瘜肉 藿香為末用猪胆汁或牛胆汁丸每服一錢 硫砂 致多不得徒恃外治法也按鼻病惟鼻湖最重當博求 絲瓜連根處縣我為末酒服此治鼻中 山栀子死的多少末之搖人身中立愈 雄黄 蘭臺執範 巴豆炭 製信 <u>=</u> 提硝

一齒漏 角がいると言 口谷 口齒 陽明 心下澹澹恐人將捕之嗌中吩吩然數唾 選用耳痔及諸瘾肉皆同 虚素 靈邪氣臟腑病形論胆病者善太息口苦嘔宿 靈襟病篇齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取 氷片 硼砂 **岩丁香** 以上俱可

寒 一窗寒 糜 人とりしている 口糜 不能發發不能下至其開閣不致故無音 有所驚駭脈不至若瘖不治自己 靈憂志無言為人卒然無音者寒氣客於厭則厭 素氣厥論膀胱移熱於 素繆刺論邪客於足陽明之經令人鼽衄上齒 靈終始為重舌刺舌柱以披針人 蘭麦軟範 小腸鬲腸不便上為口 城之痞皆不必治)鶯駁而痞者與有 Ē 肝脈鶯

滞順 金克四個人 斷齒者 口甘方素問有病口甘者此五氣之溢也名曰脾瘅失 上下齒相磨切有聲調之斷齒 子車筋脈之間故因睡眠氣息喘而邪動引其筋脈故 五味入口藏於胃脾為芝行其精氣津液在脾故令 病源 口窗方 脾冷不能收攝唌唾漬於順也 睡眠而齒相磨切也此由血氣虛風邪客於 装上

於定四車全書 口苦方素問有病口苦者病名胆痺夫肝者中之將 為消湯治之以關除陳氣也菌碎不祥除的中痰癖 者也肥者令人内熱甘者令人中滿故其氣上溢轉 內故可除陳積蓄熟之氣其氣清香能生津止渴潤肌 口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥 取决於胆阳為之使此人者數謀處不决故胆虛氣 月也胆的在与己人易二八八八人以本經之則氣不同故胆氣上溢而口苦胆家在肋本經之則不同故胆氣上溢而口苦胆家在肋本經之 中里車全書 ■ 日也胆的在背足太 上溢而口為之苦治之以胆暴愈數謀處不決 剪達軌範

瘀口瘡 〒鱼治口瘡久不差入胸中並生瘡三年己上 推頻車法干金治失欠頻車蹉開張不合 在委中之外康泉亦胆經之穴 不瘥者 濃煎薔薇根汁含之又稍稍阳之日三夜一冬用根 夏用空葉冬青葉湯 指恐誤醫傷人指也外逐 一人以手指牽其順以漸推之則復入矣推當疾出 星末 南

治緊唇方千金 次定四軍全書 一 口氣算穢方千金 口香去臭方千金 口中臭方千金 常以月旦日未出時從東壁取步七步回頭向垣立 并花水三升漱口吐**厠中良** 細辛豆養含之甚良 含水吸壁七遍口即美香此名 蘭臺軌花 壴

スケ 塗唇方干金治唇黑腫痛癢不可忍 刺舌法千金治舌平腫滿口溢如吹猪胞氣息不得通 焼亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和敷之亦治瀋唇 取蛇皮拭淨烧為灰敷之 須臾不治殺人 刺舌兩邊大脈血出勿便刺著舌下中央脈血出不 灸虎口男左女右

没是四事公告 一 療舌腫方 〒金治舌腫起如猪胞 站或如蚕子細看之有頭尾其頭少白燒錶釘烙頭 益因殺人甚急但看其舌下自有際虫形狀或如螻 先次出血汁竟傅之彌住凡此患人皆不識或錯治 釜下墨木以酢厚傳舌上下脫去更傳須與即消若 瘡數過以絕血也 上使熱即自消 止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵箆令赤熨 趙麦執死 = -

療者腫者干食治者上黑有數方大如筋出血如湧泉 療重舌千金弁治舌上生療涎出 イラガストラカスで 桂心 戎鹽 右七味蜜凡梧子大以飲服十九日三亦燒銀箆烙 此心藏病 以浦黄末傅之不過三度差 黄谷 甘草谷二 143 黄柏 大黄西五人参

んとりまたから 療者脹方千金 治失音養老 療舌腫脹本事治心脾壅熱生木舌腫脹 皇角一挺司去難蔔作用 元参 右以水二碗同煎至半碗服之不過三服便語喫却 用雄雞冠血盞或浸舌咽下即縮 右為細末毎服三錢水一盞煎至五分温服不拘時 升麻 瀬臺軌範 大黄 一個切 犀角 ニナと 甘草

琥珀犀角膏 金罗四月月 源馬喉庫干 真琥珀研 石為末研勾家為 辰砂所各片腦新 金治喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉 握一名壮勿中風截去兩頭捣取汁 犀角唇生用 治咽喉 聚仁

於定四軍全書 題 喉腫刺法革命治阳痛不得息若毒氣硬阳毒攻阳喉 口旁思意方真金 亂髮灰 愈一法刺兩手少商穴出血其穴在大指內廉去爪 刺手小指爪文中出血即愈逐左右刺出血神秘立 之唯 甲如韭菜 劢 彈子大以麥冬濃煎湯化下一日連進五服此治陰 故絮灰 蘭臺軌範 黄連末 乾薑木等分 Ť,

又方干金 數面屬方 千金治野贈鳥屬今面潔白 李子仁為末和雞子白傳一宿即落 漿水洗ご 子末酒和傅之即落 右四味研成粉和匀用人乳調每夜取傳面明且温 馬珂二兩白附子 右四味合和為散以粉瘡上不過三過 應屎白 珊瑚雨各 **方用白附** 

治牙疼方革金 止牙痛方 次足四車全書 題 治牙痛仙方 處 右研極細以飛麵為丸如菜子大絲綿褁包塞在痛 蟾酥と分殊砂 錢 雄黄末五分共三味 研極細末擦患處立愈 以羊前蹄膝合盤骨以酥塗炙黄為末入細辛末 蘭臺帆乾 雄黄谷三甘草一分

如神散局方治風牙坤牙攻在疼痛牙断動搖連 蒼耳子五升 腫 右一味以水一斗煮取五升熟含之疼則吐吐復含 **激之冷即吐** 露蜂房微冬川 右為末每用一錢水一蓋入鹽少許同煎八分乗熟 不過三劑愈無子並業指得用之 服立效 极去日及閉 二味炙灰為

細辛散局方治風蚛牙疼牙断宣爛牙齒搖動腮頷浮 荆芥 紅椒 腫 不愈故有效有不效至於喉庫一症病變各殊按牙疼有數種寒熟風火虫處治各不同非對少時用温水減口頻頻擦之立有神效治風寒 右為細末每用少許於痛處據之有涎吐出不得 福砂去最獨亞 細辛為一白芷 川鳥西二 牙皂 華松為半 牙 屬則 凹

書日行於陽夜半則行於陰陰者主夜夜者即陽者主 靈口問篇黃帝曰人之欠者何氣使然歧伯對曰衛氣 襟病 氣使然歧伯曰穀入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣 上陰者主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰 而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則日腹陰氣盡 有グドガスニ 而陽氣盛則無矣 靈素 黄帝日人之歲者至即受氣 何

與新穀氣俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣汗相逆 從上下散復出於胃故為噫 黄帝曰人之噫者何氣 巨人之噫者吃吃何氣使然岐伯曰寒氣容於胃厥逆 寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虚故為振寒寒慄 氣絕故為晞 黄帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰 巨比陰氣盛而陽氣虚陰氣疾而陽氣徐陰氣盛而陽 復出於胃故為職 黄帝曰人之啼者何氣使然歧伯 便然收伯曰陽氣和利滿於心出於鼻故為境 以王四重全書 图 蘭屋軌範 黄帝 黃帝

六腑皆揺揺則宗脈感宗脈感則液道開液道開放泣 者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也 虚則筋脈懈惰筋脈懈惰則行陰用力氣不能複故為 **泛法不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見** 涕出馬液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則 口鼻者氣之門户也故悲哀愁憂則心動心動則五臟 可人之雜者何氣使然歧伯曰胃不實則諸脈虚諸脈 金ガノドラノ 黄帝曰人之衣而泣涕出者何氣使然歧伯曰心

者故耳鳴 黄帝曰人之自齧舌者何氣使然此厥逆 黃帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於 係急心係急則氣道約約則不利故太息以伸出之 改定四軍全書 思 胃胃中有熱則虫動虫動則胃緩胃緩則產泉開故涎 走上脈氣軍至也少陰氣至則醫舌少陽氣至則醫煩 脈之所聚也故胃中空則宗脈虚虚則下溜脈有所竭 黃帝曰人之太息者何氣使然歧伯曰憂思則心 黄帝曰人之耳中鳴者何氣使然政伯曰耳者宗 蘭臺帆範

那矣害忍言哉 故上氣不足腦為之不滿耳為心告之 經明是補住其故上氣唇不知竟用補藥於邪氣所留禦犯止指針法言之庸屬不知竟用補藥於邪氣所留經之正氣以逐邪此外所謂正氣者即本經之氣故能經之正氣以逐邪此外所謂正氣者即本經之氣故能 陽明氣至則醫唇矣凡此十二邪者皆奇邪之走空家 鳴頭為心若傾目為之脏中氣不足溲便為之變腸為 令人洞心者走骨多食之令人變唱甘走肉多食之令 多食之令人雅醎走血多食之令人渴辛走氣多食之 之苦鳴下氣不足則乃為痿厥心愧 五味篇酸走筋

炎至四車全書 ! 消穀令人懸心善饑臍以上皮熱腸中熱則出黃如屎 禮臨病人問所便 飲 腸中寒則疾饑小腹痛脹 伯曰夫中熱消痺則便寒寒中之屬則便熱胃中熱則 發世 凡服滿宜温胃中寒肠中熱則脹而且泄胃中熱 臍以下皮寒梅寒字當胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴 人問心 百病始生篇陽絡傷則血外溢血外溢則衂血陰 師傳篇政伯曰入國問俗入家問諱上堂問 作執字 辨症之秘許者帝曰便病人奈何收 蘭臺軌氧 黃帝曰胃欲寒飲腸欲熱 四十二

積成矣 肠外肠外有寒汁沫與血相搏則分合凝聚不得散而 留住留則傷筋絡骨節機関不得屈伸故殉孽也 氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膕凡此八虛者皆機 有邪其氣留於兩肘肝有邪其氣留於兩脫脾有邪其 候政伯答曰以候五臟黄帝曰候之奈何政伯曰肺心 關之室 真氣之所過血絡之所遊 那氣惡血固不得住 絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢 那客篇黄帝問於岐伯曰人有八虚各何

卷七

**設定四車全書** 於心則喜年於肺則悲行於肝則憂年於脾則畏年於 為雅不納為遺溺胆為怒是為五病五精所分精氣牙 精氣并於脾熱氣留於胃胃熱則消穀穀消故善機胃 氣逆為職為恐大勝小勝為泄下焦溢為水膀胱不利 所病心為噫肺為致肝為語脾為吞腎為欠為魔胃為 酸入肝辛入肺苦入心鹹入腎甘入脾是謂五八五氣 氣逐上則胃脘寒故不嗜食 宣明五氣論五味所入 惑篇 黄帝曰人之善饑而不皆食者何氣使然歧伯曰 蘭臺軌乾

骨病無多食者甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無 王病發於血陰病發於內陽病發於冬陰病發於夏是為 多食酸是為五禁無令多食五病所發陰病發於骨陽 辛走氣氣病無多食辛酸走血血病無多食鹹苦走骨 惡寒肝惡風脾惡濕腎惡燥是為五惡五臟化液心為 腎則恐是為五年虚而相并者也五臟所惡心惡熱肺 五發五邪所亂邪入於陽則狂邪入於陰則瘅搏陽則 汗肺為涕肝為淚脾為涎腎為唾是為五液五味所禁

為癲疾持陰則為香陽入之陰則靜陰出之陽則然是 所傷五脈應象肝脈弦心脈釣脾脈代肺脈毛腎脈石 血久即傷氣久坐傷內久立傷骨久行傷筋是謂五勞 得聂脈冬得長聂脈名曰陰出之陽病善怒不治是謂 為五亂五邪所見春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋 欠己の年をとう 皮肝主筋脾主內腎主骨是謂五主五勞所傷外視傷 脾藏意腎藏志是為五臟所藏五臟所主心主脈肺主 五邪皆同命死不治五臟所藏心藏神肺藏魄肝藏魂 關麦軌和 内方

全のグロッカノニー 謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱温凉反從 味厚緩則氣味淨適其至所此之謂也是故平氣之道 者不以偶補上治上制以緩補下治下制以急急則氣 是謂五臟之脈 至真要大論大要曰君一臣二奇之 近而奇偶制小其服也遠而奇偶至大其服也大則數 六偶之制也故曰近者奇之遠者偶之汗者不以奇下 少小則數多多則九之少則二之奇之不去則偶之是 制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君三臣

其病也 於足四車全書 原 散之留者攻之帰者濡之急者暖之散者收之損者益 其制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣三佐五制之 岐伯曰有毒無毒所治無主適大小為制也帝曰請言 燥或潤或更或堅以所利而行之調其氣使其平也 涌泄為陰淡味溶泄為陽六者或收或散或緩或急或 者逆之甚者從之堅者削之客者除之勞者温之結者 中也君一臣三佐九制之大也寒者熟之熟者寒之微 岐伯曰辛甘發散為陽酸若涌泄為陰醎味 期度執範

べ逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之簿之切之 開之發之道事為故 帝曰及治何謂政伯曰熟因寒 寒而反熱服熱而反寒其故何也此伯曰治其王氣是 和可使必己 岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣 所因其始則同其終則異可使破積可使清堅可使氣 用寒因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其 取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也帝曰善服 之謂使非上下三品之謂也 岐伯曰諸寒之而熟者

於定四軍全書 題 精不足者補之以味其高者因而越之其下者引而竭 以反也 五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入 大論政伯曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七 之因其重而減之因其衰而彰之形不足者温之以氣 心甘先入脾辛先入肺鹹先入骨久而增氣物化之常 小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食 之中满者写之於內其有邪者清形以為汗 五常政 也氣增而久天之由也 陰陽應象大論因其輕而揚 蘭麦帆死

養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法必先歲氣 諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸燥狂越皆 諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣順鬱尚 屬於火諸暴強直皆屬於風諸病有聲鼓之如鼓皆屬 拜瘡皆屬於心諸厥固泄皆屬於下諸痿喘嘔皆屬於 無伐天和 至真要大論帝曰顧聞病機何如收伯曰 上諸禁鼓慄如丧神守皆屬於火諸痓項強皆屬於濕 屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱發瘛皆屬於火諸痛

改定四車全書 門 辟積於夏使人煎威目盲不可以視耳閉不可以聽潰 暴注下迫皆屬於熟 生氣通天論陽因而上衛外者 於氣為腫四維相代陽氣乃竭陽氣者煩勞則張精絕 濕熱不攘大筋經短小筋殖長無短為拘殖長為麼因 則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散因於濕首如表 也因於寒欲如轉極起居如驚神氣乃浮因於暑汗煩 濁皆屬於熱諸病水液澄澈清冷皆屬於寒諸嘔吐酸 於熱諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火諸轉反張水液渾 蘭凌軟氣

**柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大樓陷脈為痿留** 內理乃生癰腫魄汗未盡形弱而氣療穴俞以閉發為 連肉膝偷氣化薄傳為善畏及為驚駭管氣不從逆於 風雅故風者百病心始也清静則肉腠閉拒雖有大風 如持虚勞汗當風寒漸為鼓鬱乃座陽原者精則養神 使人偏枯汗出見濕乃生痤沸高粱之變足生大丁受 血荒於上使人薄厥有傷於筋縱其若不容汗出偏沮 溃乎若壞都汩汨乎不可止陽氣者大怒則形氣絕而


奇毒弗之能害此因時之序也 於王四華全等一 穀入少而氣多者邪在胃及與肺也 玉肌真臟論黄 精氣奪則虚 帝曰余聞虚實以次死生顧聞其情岐伯曰五實死五 得之傷暑穀入多而氣少者得之有所脱血濕居下也 為痿厥冬傷於寒春必温病四時之氣更傷五臟 乃為洞泄夏傷於暑秋為痰瘧秋傷於濕上逆而致發 平虚實論黃帝問曰何為虚實政伯對曰邪氣盛則實 刺志論氣盛身寒得之傷寒氣虚身熱 蘭臺軌氣 春傷於風邪氣留連 四九

急食鹹以耍之用鹹補之甘寫之脾苦濕急食苦以燥 虚死帝曰顧聞五實五虚岐伯曰脈 藏皮熱股脹前後 散之用辛補之酸寫之心苦緩急食酸以收之心欲更 臟氣法時論肝告急急食甘以緩之肝欲散急食辛以 泄注止則虚者活身汗得後痢則實者活此其候也 不通問裔此謂五實脈細皮寒氣少泄痢前後飲食不 入此謂五虚帝曰其時有生者何也歧伯曰滎粥入胃 )脾欲緩急食甘以緩之用苦傷之甘補之肺苦氣上

欲坚急食苦以堅之用苦補之醎寫之 夫那之客於 次王四年红季 理方能職症 擇方 所生而持自得其位而起必先定五臟之脈乃言問甚 **身也以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至於** 寫之腎若燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也皆 畜為 盖五菜為充氣味合而服之以補精益氣 辨病治 逆急食岩以泄之肺欲收急食酸以收之用酸補之辛 病之總計能精通其 /時死生之期也 毒藥攻邪五穀為養五果為助五 閱產机乾 **及**十

食体 你胃移熱於胆亦曰食你 解体 故開折者氣不足而生病 寒不甚熱不甚惡見人見人心惴惴然熱多汗出甚 緩為洞洞者食不化下嗌還出 而少氣不欲言 素玉肌真臟論冬脈太過則令人解你發脈痛 素氣厥論大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食 靈根結為太陽為開開折則食原無所輸膈洞 刺瘧論足少陽之瘧令人身體解你 **那氣臟腑病形篇腎脈微** 

口重強 於足四事全事 一 齲齒 重強 **齒鯛刺手陽明不已** 按甲乙經註手陽明脈商陽二問三問合齒中故當刺商陽穴不已則刺其痛脈之 主齒痛 温溜火 在左左熱在右右熱在上上熱在下下熱 金匮 靈論疾診尺篇診齲齒痛按其陽之來有過 **嚴論脾脈不及則令人九竅不通名** )刺其脈入齒中者立己 蘭臺軌死 展 贯 妈 明 五十 繆刺 齿



欽定四庫全書子部

蘭臺軌範卷八

詳校官太醫院院使臣張肇基

洗馬臣王坦修覆勘

校對官學正臣湯 垣 總校官庶吉士臣何思釣 謄録舉人臣蔡枝華

其可犯也衰其大半而止過者死 久已日日十七日 三 一年 おおかっ かけんごう The state of the s 開奏輕節 Control of the Contro 1000 口願聞其故城伯曰大積大聚 身重毒之何如岐伯曰 腹中論帝曰何以

者好子也 陰之脈貫腎緊舌本故不能言帝曰治之奈何政伯曰 論黃帝問曰人有重身九月而瘖此何為也政伯曰胞 無治也當十月復 知懷子之且生也此伯曰身有病而無邪脈也 姓之為病其內苦結女子為痕聚 之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎心 難經 平人氣象論婦人手少陰脈動甚 左者為腎右者為

一致定四庫全書 冒其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者 血復 汗寒多故多勢冒亡津液胃燥故大便難產婦鬱 血虚而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虚下 精女子以緊胞 問曰新産婦人有三病一者病産二者病鬱冒三者上 命門命門者諸精神之所舍原氣之所緊也男子以藏 便難何謂也曰新産血虚多汗出喜中風故令病産亡 金匮 題座執範

湯主之 氣獨磁故當汗出陰陽乃復大便壁嘔不能食小柴胡 孤陽上出故頭汗出所以産婦喜汗出者亡陰血虚陽 産後と八日無太陽証少腹堅痛此惡路不盡不大便 則讝語至夜即愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀時 煩燥發熱切脈微質再倍發熱日脯時煩燥者不食食 假令不愈者此為腹中有疼血者臍下宜下豚血湯ま /亦主經水不利 不宜太過師曰産婦腹痛法當以枳實芍藥散

人傷寒發熱經水適來畫日明了暮則讝語如見思

凉和胸肠滿如結胸狀讝語者此為熱入血室也當刺

期門隨其實而取之期門二於在乳頭直下四寸第

婦八之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷年血

寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎睡久成肺

前臺帆範

於定四車全書 !

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遅身

狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈

其針樂治危得安其雖同病脈各異源子當辨記勿謂 或結熟中痛在關元脈數無瘡肌若魚鱗時者男子非 脈虚多寒三十六病干變萬端審脈陰陽虚實緊弦行 止女身在下未多經候不句今陰學漏少腹惡寒或引 形體損分在中盤結繞臍寒症或两肠疼痛與臟相連 顧或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非有思神久則贏瘦 腰脊下根氣衝氣衝急痛膝腔疼煩奄忽眩冒狀如厥

大人の大の大田大山上 か 無 腹如扇形容惡所以然者子臟開故也當附子湯温之 殷裏急腹滿手掌順熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶 問日婦人年五十所病下痢數十日不止暮即發熱小 唇口乾燥故知之當以温經湯主之 下何以故曾經半產家血在少腹不去何以知之其証 一懷妮六七月脈好發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少 陷經漏下黑不解服蓋湯主之 顯复歌範 **宜是那父湯** 

喜覧胎也按查 狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞官屬 胎 足故不能養胎所以致胎數墮候妊娠而恒腰痛者 **娠數墮胎候** 小便微利則愈 病源 傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有 妃 11.1.1 一生候 血胎執行 血氣虚損子臟為風冷所居則血氣 **陽施陰化精盛有餘者則成兩胎** 氣

其兩胎而 胞轉 翳小轉動勞贏是挾於病必過時乃産 帶下三十六六 胞落並致死 姙娠過年不産 七宮五傷三固是也十二般者是所下之物一如膏 相搏令胎不長産不以特若其胎在胞日月雖多其胎 臍下急痛小便不通是也其病由不同胞轉及 死者候其胎上冷是胎已死也 由挾寒冷宿血在胞而有胎則冷血 諸方説三十六疾者是十二癥九痛

於起四車全書 一

魔養軟死

五

葵根羹八如炭血九如青血血似水十如米汁十一 痛七汁出陰中如虫醫痛八脇下皮痛九腰痛七害者 **淋痛三小便即痛四寒冷痛五月水來腹痛六氣淌並** 月浣十二經度不應期也九痛者一陰中傷痛二陰中 五傷者一窮孔痛二中寒熱痛三小腹急牢痛四臟不 如青血三如紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如 仁五子門不正引腎痛三固者一月水閉塞不通其餘 一害食二宫氯三宫冷四宫券五宫房六宫班七宫睡

惡阻 與思交 アスハンリュューハトア 剧者不能自勝舉也此由婦人元本虚贏血氣不足腎 氣又弱軍當風食冷太過心下有疾氣挾之而有好也 食氣欲噉食鹹酸果食多睡少起乃至三四月以上大 二固文缺不載 獨言笑悲泣脈來遲伏或如鳥啄 心中清問頭蛇四肢煩疼解情不欲執作惡聞 此由脾胃虚弱有停水而挟以妊娠也水清於 臟腑虚神守弱思氣得病之也其狀不欲見 蘭麦軌苑

多分四月全書 思胎 胎 胎 水血多也初妊娠者則反壞胎 胞則令胎壞惟將産之月而脚微腫則其產易蓋胞藏 經血分而為水故曰血分 血 亦名胞阻漏血盡則人斃也 疸 漏 分 其母職氣熱重然於胎 是經血先斷而後成水病以其月水壅塞不通 此由衝任脈虚不能約制太陽少陰之經血 正虚則妖恐精入臟狀如懷娘 卷

陰臭 臭也熱所致 有因産用力偃氣而陰脱者 胞絡傷损 桂枝茯苓圓金匮治婦人 相容故令開也 >臟閉 婦人方 由子臟有寒寒搏於津液蘊積氣衝於陰故變 由子臟宿虚因產冷氣來之血氣得冷不得 内 3 >臟虚冷氣下衝則陰挺出謂之下脱亦 人宿有瘦病經断未及三月 而

ストンコー

Likin

閱查觀範

ł

當歸芍藥散金 置治婦人懷娘腹中污痛 多分四月全書 雷歸三兩芍樂一斤茯苓四兩白木四兩澤寫半 者前三月經水利時胎也下血者後斷三月部也所 得漏下不止胎動在臍上者為凝痼害妊娠六月動 知加至三九 右五味末之煉蜜九如兔屎大每日食前服一九不 以血不止者其癥不去故也當下甚难此主之 丹皮 茯苓 桃仁去皮药藥分等

炎足四車至雪 图 葵子茯苓散金量治好娘有水氣身重小便不利酒淅 乾監人參半夏九 意治妊娠嘔吐不止 机黄 葵子一斤茯苓三两 右二味杆為散飲服方寸七日三服小便利則愈 右三味末之生薑汁糊九如梧子大飲服十九日三 芎藭 : 兩杵為散取方寸乙酒和日三服 惡寒起即頭肢 人参两半夏二雨 随臺執紀

當歸散金 婦人好娘宜常服 雷歸見母若參九金過治姓娠小便難飲食如故 白术散金 婚娘養胎 多りにかる **潘歸** 當歸 産胎無苦疾産後百病悉主ご 右五味籽為散酒服方寸七日再服妊娠常服即易 右三味末之蜜丸如小豆大飲服三丸加至十九 黄芩 貝母 苦參分等 芍藥 卷八 号 新各一 白术半斤

次モリ事とち 枳實为樂散金優治產後腹痛煩滿不得即 白术 者大麥粥服之病雖愈服之勿置分兩 細辛一兩字夏大者二十枚服之後更以酸聚水服 右四味杵為散酒服一錢七日三服夜一服但苦痛 之若嘔以醋漿水服復不解者小麥汁服之以後湯 加芍樂心下毒痛倍加芎藭心煩吐痛不能飲食加 枳實焼令黑芍藥等分 当家 衛麦鞭範 蜀椒五升壮碼 竹葉湯金寶治産後中風發熟面正亦喘而頭痛 下瘀血湯金匱 瘀血湯主之亦主經水不利 右二味杵為散服方寸七日三服并主濫腹以麥 下之假今腹痛不愈此為腹中有瘀血者臍下宜下 新字當作無字 作煎又一法 以酒一升煎一丸取八合頓服之新血下如豚肝 大黄三两桃仁太十廣出二十枚末之家和為四九 按

**欽定四庫全書 ──** 竹皮大九金屬治婦人乳中虚煩亂嘔逆安中益氣 生竹茹ニ分石膏ニ分桂枝「分甘草ン分白微 汐 唱者加半夏半升洗 頸項強用大附子一枚破之如豆入前藥揚去沫 北為根三兩防風 甘草雨一附子一枚大聚十五生薑五两 一斗煮取二升半分温三服温覆取汗出 蘭臺歌範 枯梗 1

白頭翁加甘草阿膠湯金通治產後下痢虚極 半夏厚朴湯金賣治婦人四中如有炙醫 白頭翁 右五味末之衆內丸如彈子大飲服一九日三夜二 半夏一月厚朴三兩茯苓四兩生黃五兩乾蘇葉 右六味水火升煮二升半内膠令消分温三服 兩檗皮三两 有热倍白微 甘草 煩喘者加拍實一分 阿膠各二秦皮三兩黃連

一次正四年全書 一 温經湯金匱主婦人曾經半産瘀血在少腹不去其証 甘麥大棗湯金屬治婦人職帰悉傷欲哭象如神雪所 唇口乾燥 甘草三两小麥一开大聚十枚 作數欠伸此主之 右三味水六升煮取三升分温三服亦補脾氣 右五味水七升煮取四升分温四服日三夜 兩 蘭臺朝氣

土瓜根散金屬治帶下經水不利少腹滿痛經一月再 見 具菜黄三兩當歸二兩芳第二兩芍藥二兩人奏 两半夏一升麥冬一升水一斗煮取三升分温三服 兩桂枝二兩阿膠二兩月皮二兩生薑三兩甘草 水來過多及至期不來總方 亦主婦人少腹寒久不受胎第治崩中去血或月 芍藥 桂枝 産出る三

次との事を与し 旋復花湯金量寸口脈弦而大弦則為威大則為芤減 大黃甘逐湯金屬治婦人少腹滿如敦狀小便微難而 服 旋復花三兩葱十四新絳少許水三升者取一升頓 漏下此湯主之 右三味杵為散酒服方寸七日三服此治無血伏留 不渴此為水與血俱結在血室也此主之 則為寒芤則為虚寒虚相搏此名曰革婦人則半産 蘭臺軟範 <u>+</u>

礬石丸 金 通治經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下 紅藍花酒金圖治婦人六十二種風腹中血氣刺痛 磐石馬 哈合仁 白物 右二味末之煉蜜丸聚核大内臟中劇者再內之 右三味以水三升煮取一升頓服其血當下 大黄四两甘逐二两阿膠二兩 红藍花一两河外大煎减半頓服一半未止再服

蛇床子散金遣治婦人陰寒温陰中坐藥 狼牙湯金賣治婦人陰中生瘡蝕爛者 一物黄苓湯干鱼治婦人在草屬自發露得風四肢苦 煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之 陰中日四遍 狼牙三两水四升煮取半升以綿纏節如酶絞湯瀝 裴内之自然温 蛇床子一味末之以白粉少許和合相得如聚大鄉

大王日奉 (1)

蘭麦軟乾

當歸建中湯干金治産後虛贏不足腹中刺痛不止吸 黄芩 大豪村二 右三味水六升煮取二升温服一升多吐下虫 當歸四兩桂枝三兩分樂六兩生薑三兩甘草二兩 右六味水一斗煮取三升分温三服一日令盡 吸少氣或苦少腹中急摩痛引腰背不能食飲產後 月日得服四五劑為善令人強壯宜 两各参二兩地黄四兩 回生身 佛手散在等却又調經 考第二兩當歸二兩 右為細末毎服二錢水一盞酒二分煎と分温服 去血過多崩傷內匈不止加地黃六兩阿膠二兩 大虚者如飴糖六兩湯成內之火上緩令飴消 此惟生之聖樂

再熬次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦 當歸酒洗芳舊 盆盛之大黄鍋粑亦鏟下入後藥同磨 人参 斤熬之又加醋三斤次第加果然後下黑豆汁三碗 斤文火熬之以長木筋不住手攬之成膏再加醋三 去淹取汁米酷者更佳將大黃末入淨鍋下米醋三碗煎三滚米酷九斤陳籽大黃末入淨鍋下米醋三 沙浦黄 屬纸茯苓 地榆酒洗川羌活 香附醋炒延胡索酒炒蒼木米 桃仁皮头油 牛膝面钱 白芍錢酒 中

次定四車全書 一 閉骨 散 稜五錢醋沒五靈脂五錢醋煮化山英內五錢酒錢馬鞭草五錢秋葵子三錢熟地茶師如法製就, 本 一 两酒浸九次 **乳不可火烘燥蠟為殼馥之用時去蠟** 匀再下熟蜜一斤共搗干杵為九重二錢と八分陰 二十味并前黑豆殼共晒為末入石臼內大黃膏拌 臨産婦交骨不開 去複炒乳香 蘭臺鞭範 子五 一盆母

奪命散 死胎方本事 没藥 桂木三錢麝香當門子 服 當歸五錢龜板三錢醋芎第二錢婦人髮 右研為細末纔産下用重便細酒半杯煎一二沸調 下二錢良久再服其惡血下行便不衝上免生百疾 血竭等分 産後 **粒全研温酒服須臾如手** 一團水煎

交加散本事治婦人禁衛不通經脈不調腹中最痛氣 设定四車全書 一門 護胎方本事治妊娠時氣身熱令子不落 右交互用汁浸一夕各炒黄漬汁盡為度末之尋常 生地黄 五两 生薑 五两 多血少結聚為瘕產後中風 **伏龍肝為末水調塗臍下二寸乾則易差即止** 推下此之用水銀等藥此不致損元氣也 腹痛酒調下三錢尤不可缺 商安航死 十六

イラインドラノ ノニョー 海蛤散本事治婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近 小柴胡加地黄湯本事治婦人室女傷寒發熱或發寒 柴胡 亦治産後惡露方來忽爾斷絕 取井中泥塗心下乾則易 熱經水適來或適斷畫則明了夜則嚴語如見思狀 右為末每服二錢雞子清調下 滑石 黄芩 卷八 甘草兩 芒硝半雨 甘草

一次王四年上号 一零 烏雞煎圓局が治婦 洗焙者 木香 烏雄雞 紅花 兩 石為末每用五錢水二盞生薑五片棗二枚煎至 力去查服此即熟 黄溪 隻 川鳥泡 烏樂 琥珀 始前産後 蘭臺軌範 海桐皮 草菓 白术 內豆蔻 再 陳皮 諸般疾患並皆治之 芍藥白者附子 延胡索 石牀 t 丹皮 地黄 去泡

猪蹄汤局 为治乳婦氣少血衰脈滋不行絕無乳汁 金はひじたろうと 猪蹄一隻木通五兩 勝內桂去粗塗我茂西 為木米沿浸切 右將猪蹄凈洗依食法事治次用水一斗同木通浸 油單紙盛焙乹為細末煉蜜九如梧子大毎服三十 放雞腹中用新尾瓶好酒一斗同煮令乾去雞骨以 右細剉用烏雄雞一隻湯撏去毛及腸肚將上藥安 表

紫石英九 局方治婦人久冷無子及數經墮胎經水不 たこりにいい 美仁 烏賊魚骨燒灰甘草炙 濁 煮得四五升取汁飲如乳不下再服為妙 調崩漏帶下三十六疾積聚癥瘕少腹急重小便白 續斷 当然 肉桂去粗 卷柏 細辛 壮蒙 蘭臺軌氧 桑寄生 禹餘粮醋辛と次人 石斛 别所山箭两半辛 牛膝 乾熟地黄 厚村

金八八八月白書 惟生丹局方治産婦産育艱難或逆或横並宜服之 皮各一 薑汁食茶笋 飲下空心食前日二服 右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十九温酒或米 母丁香我一麝香别研兔腦髓膜月者去乳香奶 石拌勺以兔腦和圓如雞豆大陰乾用油紙蜜封貼 两天門冬去心紫石英細研飛 當歸炒 川鳥及時乾黃泡 月 細研

大子り日から 小調經散局方治產後敗血循經流入四肢腐爛如水 細辛 温水服 味参蘓九 没藥 服此血行腫消則愈 是稔 最分 良病 琥珀 九即時產不 麝香谷五為末薑汁酒各少 /後察血入肺咳嗽喘急 桂心 崩妄帆能 ·隨男左女右手中 白芍 許調服此義 九 血方

茶蘇飲嚴氏治子懸腹痛或臨產驚恐氣結連日不安 紫散月經 上血崩 金月四月日 **高歸** 或大小便不利 口鼻黑氣起急用此藥加附子五錢亦有得生者 一劑水煎服若既愈當用六君子湯以補脾胃若 橋皮谷上白芍妙五紫蘇一銭 養葱引水煎服 索蘇是蘇木 甘草 大腹皮黑豆浸人參 当我

改定四事全書 一个 求嗣方称少壬子日合藥別日不用名助陽丹 春光 附子生用茯苓各一两白被 右十四味為末煉蜜丸如菜豆大每服三十九空心 米飲任下未效再加數九己覺有孕便不可服 海步治婦人無子 存性為末熟酒調方寸七再服立定生末安胎 桂心 半夏各五人参 顧喜執範 2一两細辛 防風 乾酱 銭 雨 沙琴

黃龍湯者人姓城寒熟頭疼嘿嘿不欲飲食胸下 をかん ドライン・ 斷病後勞復餘熱不解 逆痰氣及產後傷風熱入胞宫寒熱如瘧升經水適 細辛五銭牛膝二兩茯苓 當歸三錢 肉桂 白嶔 一两黄芩 白发 致 者陰虚血少者非宜 以上二方治胞寒無子 へ参 秦艽 厚朴 兩沒樂四銭 具茶黄 乳香 石菖蒲 防風 附

没足四年之的一一 大承氣湯金匱後人八日無太陽症少腹堅痛惡露 桂枝湯金屬婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無 小茶胡湯金屬婦人中風七八日續來寒熱發作有時經 寒熟名班娘桂枝湯主之於法六十日當有此證設 有醫治廷者却一月加吐下者則絕之見傷 水適斷此為熱入血室其血必結故使如难狀見傷 右四味每服五錢水一盞半煎一盞去渣温服 不盡不大便煩燥發熱切脈微實再倍發熱日脯時 衛臺航節

**夢歸膠火湯金屬治陷經漏下黑不解治通** 猪髮膏煎每 買氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實力 金ガスセラクスで 小青龍湯金屬婦人吐涎沫醫及下之心下即痞當先 寒見 煩燥者不食食即藏語至夜即愈熟在裏結在膀 见疸 治其吐涎沫此主之致痰涎沫止乃治痞渴心湯主 見血

**設定四車全書** 雷歸生薑羊肉湯 酱治產後腹中污痛并治腹中寒 腎氣九金過治婦人飲食如故煩熱不得即而反倚息 本專門心書詳考之 等法探本索源而發 大方論一卷故亦思 大方論一卷故亦思 大方為一卷故亦思 大方為一卷故亦發 者此名轉胞不得溺也以胞系了废故致此病但利 小便則愈即在氏八味 之以畏後瘕 蘭麦軟氣 或婦人常用之方數十首至可死用今因金匱要器有治等疾病變多端必從調經種傷等症與男子同無庸另立 主 其婦子治

細為寒脈亂不治 服務急氣不脈沉緩傷食脈促結虚鶯脈浮為風脈沉 兒 関以縣其病魚印 員也脈紋從寅関起不至卵関 者易治若連卵屬者難治若寅侵卵卵侵過辰者 全幼心鑑云小兒一歲以前看虎口食指寅卯辰三 卷查閱以便業幼科者專取此書 紀之在而方未備者更考他書補 犯成本務俱從錢氏直決選出 脈法 

· 飲定四車全書 者熱也宜隨症治之 左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾類為腎若色亦 弦急為客件 **弦急污沉四五歲後脈七八至而細數者為平九至** 者傷十至者困六至五至者為虚為寒弦緊為風癇 以類而推之一歲後則可用一指轉側辨其三部脈 不救一其脈紋見有五色如因驚必青寫南必紫當 面部症 ~ 蘭臺軌範 Ī

熱目無晴光者腎虚也 者肝虚熱黃者脾實熱微黃者脾虚熟白而混者肺實 心主驚實則叫哭發熱飲水而搞虚則即而悸動不安 目內色亦者心實熱淡紅者心虛熱青者肝實熱淡青 心氣實則喜仰即 視其睡口中氣温或合面睡及上贏咬牙皆心熱力 目部症 五臟虚實寒熱

次王四華全等 原 直視風甚則身及張強直不搖心不受熱也當補腎治 揚 肝 而欲發端也 脾主因實則困睡身熱飲水虚則吐寫生風面白腹痛 肝主風實則目直大呼呵欠項急頓問虚則咬牙多欠 口中氣冷不思飲食或吐清水 肝熱則手尋衣領及亂捻物壯熱飲水喘潤目赤發 肝有風則日連劄得心熟則發搖或筋脈牽繁而 嚴重赖範 阿欠多睡者脾氣虚 古

氣不足目無情光面白顏解此皆難育雖育不壽或更 腎主虚無實也惟瘡疹腎實則變黑陷若胎禀虚怯神 氣長出氣 肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虚則哽 而身編也咬牙者腎水虚而不能制心火也 加色欲變症百出愈難救療或目畏明下竄者蓋骨重 則胸滿氣急喘嗽上氣 促哽氣者難治肺虚甚也 肺熱則手指眉目鼻面 肺臟怯則唇白悶亂氣粗喘 肺盛復感風寒

小兒在母腹中乃生骨氯五臟六腑成而未全自生之 變蒸

自下而上又身熱故已生之日後三十二日一變變每 果即情性有異於前何者長生腑臟智意故也何為三


後即長骨脈五臟六腑之神智也變者易也自內而長

十五碎骨外有三百二十自生下骨一日 十段而上之 十二日長骨添精神人有三百六十五骨除手足中四

次之四年在時 随麦帆轮

十日百段三十二日計三百二十段為一遍亦曰一然

心身熟面亦引飲口中氣熱二便黃亦甚則發播蓋熱 骨氯乃全而未壯也 骨之餘氣自腦分入銀中作三十二齒而齒牙有不及 小兒急驚因聞大聲或驚而發搖搖正如故此熱生於 發虛熟諸病如是十周則小然畢也計三百二十日生 まらいかと 三十二數者由變不足其常也或二十八日即至長二 八齒以下做此但不過三十二之數也凡一周遍乃 急驚風症治




若傷食發搐身温多睡或吐不思食 灣 癇發搖男則目左視無聲右視有聲女則右視無聲 若傷風發播口中氣熟呵欠頓問手足動搖 左視有聲相勝故也 百日內發搖真者不過二三次必死假者頻發不死真 以治其母後做此 **逐女則义入食指為逆於外為順仍參吮乳不能類 微點運順男則握拳拇指义入食指中為順於外為** 

· 欽定四車全書 一 在屬肺也若肢體如尸口吐 涎沫其聲如猪症屬腎力 犬症屬肝也若目瞪吐舌其聲如手症屬心也若目直 者內生驚癇假者外傷風冷血氣未實不能勝任故發 凡治五瘦皆隨臟治之每臟各有一獸之形並用五色! 腹痛其聲如牛在屬脾也若鶯跳反折手縱其聲如雞 九治之發而重者死病甚者亦死若反折上竄其聲如 癲癇症治 除臺東範 ニ ナ と



炎王四華全事 際之下若三指俱熱感受風邪鼻塞氣粗三指俱冷感 熱夾驚之候食指熱胸膈氣滿乳食不消 受風寒臟冷吐為若食中二指熱上熱下冷名中二 小兒半歲之間有病以名中食三指曲按額前眉上 附虎口三閣脈症圖 蘭邊軌範 Anna Line



水鏡訣云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生 或青或紅如線直者是母食傷脾左右一樣者是驚 氣関則難治交命關為死症又當辨其色如獸驚三 差誤未至三歳看虎口三闋若脈見風關尚易治交 五臟六腑部位各分逆順難明若憑寸口之浮沉必 南黄色是雷鹭三関脈通度乃極驚之症必死有紋 至横亡於孩子須明虎口辨别三關消詳用藥必無 関必青水鶯三関必赤人為三関必黑若紫色主寫 蘭臺觀範

天之四年公野 一

食所傷或驚恐所觸則其毒當出初起之候面燥腮亦 小兒在胎食五臟血穢伏於命門若遇天行時熱或乳 寒及嗽紅主泄瀉有黑相兼主下痢紅多白痢黑多 矣 五色由其病甚色能加變至於純黑者不可得而治 赤痢有紫相兼虎口脈亂乃氣不和也蓋脈紋見有 積齊發紋有三條白主肺傷風痰或齁輪聲青主傷 五臟瘡疹証治

スペスンリーという 者順反此為逆惟腎無候但見能冷耳冷是也若寒水 節飲食慎風寒 五臟各有一症肝臟水疱青色而小 故色赤黄淺也先發膿疱後發疹子者順先疹子後海 肺臟膿疱色白而大心臟海色亦而小脾臟疹小次極 悸多睡宜究其何臟所發察其何因所起令乳母亦類 各三服不愈者死 目胞亦亦呵欠頓問作凉作熱咳嗽嚏噴手足稍冷驚 來悔故黑陷而耳亂反熱為逆也急用百祥凡牛李膏 如發潮熱三日以上出不甚多而 蘭臺軌範

我好四月在書 重也瘡端裏黑點如針孔者勢最劇也青乾紫陷昏睡 者輕裏外微紅者輕外黑裏赤者微重外白裏黑者大 熱不止者未盡也潮熱隨出如早食潮熱不已為水疱 急以百祥九下之復惡寒不己身冷出汗耳能反熟者 之類也一發便出盡者重瘡夾疹者半輕半重也出稀 死症也此腎氣大旺脾虚不能制故耳下後身熱氣温 小便解熱毒若紫黑乾陷或寒戰咬牙或身黃腫紫者 汗出煩燥熱渴腹脹啼喘二便不通者因也有大熱利

者宣風散下之若能食而如頭焦起或未焦而喘實亦 煩渴腹滿而喘便溢面亦悶亂大吐此當利小便不瘥 陷秋癍子冬疹子者十活四五黑者十難救一 身熱 逆冬月腎旺或寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏思 飲水者可治以脾土勝腎寒去而温熱也不思者不可 可下之若五七日如不焦是内熱也宣風散薬之生犀 下下則內虛歸腎大抵瘡疹屬陽在春夏為順秋冬為 海疹作搞為脾虚而肝則來心人妄動風熱

くないりになった。

蘭臺歌範

金分四月百十 者乃脾氣實腎邪退而病安也及寫而乳食不化者脾 相搏也當寫心肝補脾土 虚不能制腎故難治 疑收屬等說大抵宋時之瘡形治法不過如此近日 病隨時隨地變化無窮所以內經有五運六氣異法 **方宜等論為醫者苟不能知天運之轉移及五方之** 愈變愈重與與疹絕不相類治亦迎别因知天下之 此即近世痘瘡之症其病與海疹同列並無起脹成 瘡黑而忽便膿血汗亦皮

養非法之不善也况即有死者不過百中之一較之天 年以來崇奉怪書不論小兒之強弱痘症之虚實概 路此天意好生有神人出馬造良法以救人也然人 之書自宋至今不下數十種莫不和平切近熟意運 行惡痘十死八九者其安危相去何如也至於治痘 往往以種痘仍有死者疑而不敢種不知乃治之不 痘瘡無人可免自種痘之法起而小兒方有避險之 體性終有偏執之處不可以稱上工也

一跃在四軍至書 屋

蘭克教範

兒腹以增其毒而爛其胃宛轉就死尤可痛心夫近 黄石膏之功而此二味遂為不祧之樂矣又方中多 用蜂房蝎子蠐螬蚯蚓蚌汁等恶物成升成碗灌入 目不知此實醫者致之死地也或幸不死則信為大 能起脹或不能成漿而死至期果死其父母以為神 日時醫治精壯男婦之病見用清火之樂一二錢羣 大傷絕其起脹成漿之路因向其父母云此症或不 以大黄數兩石膏數斤為一劑使兒真火消盡元氣 次定四事全等 图 白玉散塗之 丹瘤之症因熱毒客於腠理搏於血氣發於皮膚當以 接踵而不悔何耶醫者不足責為父母而目觀其子 數月之小兒反用大寒大毒之樂成兩成斤便死者 之服此毒藥以致條死毫無疑怨則何心也 以為此寒凉之品斷不可服必當用附桂參求獨於 丹瘤 傷風兼變症治二 随臺執死 Ī

而 氣兼脾則因睡軍腎則目畏明各隨補其母 冷飲食者問氣實熱也 發熟而不欲飲水者胃氣虚熟也發熟而飲水作湯喜 þ, 潮熱者時間發熱過時即退來日依時而發此欲發驚 傷風兼肝則發搖頓悶秉心則驚不安兼肺則喘败 金グドルペー 口中氣熱乃風邪外感也 諸經發熱症治三 壯熱者常熱不己甚則發驚痼也 老八 温熱者肢體微熱也 風熱者身熱

稀必 問虚冷也 若吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下之 凡小兒疳在內目腫腹脹泻痢青白體瘦羸弱疳在外 拉淨口中否則暗聲一發穢物四下致生諸病找去穢 えこうき シャー 吐寫后倦睡不露睛者胃實熱也吐痰涎及緑水者 五臟內外疳症主治 吐瀉症治 初生下吐因穢惡下咽故也凡初生急須 劉臺教苑 14

一部定四库全書 **算下亦爛頻揉鼻耳或肢體生瘡鼻瘡用關香散諸瘡** 諸藥痢之若患癖當消磨若誤以己豆硼砂下之及傷 瘦削遍生瘡疥喜則濕地 皮膚乾溢而有瘡疥腹大嗜土 用白粉散 寒誤下皆能成疳其初病者為熱疳久病者為冷疳冷 口鼻生瘡 心府面黄頰赤身體壯熱 若患潮熱當先補肝後寫心若妄以稍黄 肝疳一名筋疳白膜遮睛或泻血面瘦 脾疳一名 肥府體黃瘦削 肺疳一名氣肝喘嗽氣促 腎疳一名骨疳肢體

熱相軍者津液短少者皆因大病脾胃虧損內亡津液 所致當固脾胃為主早為施治則不變敗症也 うてこうこと しいとう 食或嘔利撮口此脾土虚而寒水所侮也若口中氣温 也誤下之以致目疤腮面四肢浮腫肚腹愈脹因下而 面色黄白目無睛光或多睡惡食或大便酸臭此積病 也若腹脹而問亂喘滿者實也若不問亂喘滿者脾虚 見腹痛體瘦面色能白目無晴光口中氣冷不思飲 腹痛腫脹諸症 蒯喜執範 Ē

喘脾氣益虚也脾虚不能勝腎水隨肺氣行於四肢如 銀定匹庫全書 若腹中有癖不食但飲乳是也蓋小兒病此良由乳食 與癇相似但目不斜手不搞也安出散主之 若口吐涎沫或吐清水面號白心腹痛有時者垂痛也 水流走四肢而身面皆腫若上勝則刑於肺故令喘也 若腎熱傳於膀胱熱甚送於脾肺脾胃虚而不能制腎 水狀若侵浮於肺即大喘也 不消伏於腹中乍冷乍熱飲水過多即為滌腸胃亡失

大而成疳矣 津液脾胃虚弱不能傳化水穀以致四肢羸瘦肚腹漸 五臟雜症主治

喜汗者厚衣即而額汗出也盗汗者肌肉虚而睡中汗

出也 胃虚汗者上至項下至臍也六陽虚汗者上至 頭下至項難治 夜啼者小兒筋骨血脈未成而多哭脾臟冷而痛也當

一次之四東至書 一

與温中藥或花火膏主之 若虚怯為冷所乘則唇青

爾麦歌笠

弄

解顧者生下題門不合也長必多愁少笑目白精多面 大病未已而弄舌者孟 脾胃虚而津液少也兼面黄肌瘦五心煩熱者疳積也 若浴後拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虚也 色統白或體消瘦皆腎虚也 弄古熟者脾臟微熱令舌絡牽緊時時舒熱或飲水者 驚啼者邪氣來心也當以安神九主之 若頻撮口是氣不和也

胎熱者生下有血色時叫哭身熟淡黄目睛多赤大便 胎肥者生下豐厚目睛粉紅大便乾難時出涎水

多噦亦用浴體法

急欲乳不能食者此風邪由臍而蘊熱心脾致舌厚唇

一 帰不能吃乳也

龜胸龜背者由兒生下風客於脊入於骨髓致成龜背

炎色四軍全勢

T.

蘭卷軌孔

胎怯者生下面白肌肉瘦弱大便白水身無血色哽氣

色黄急欲食乳並用浴體法主心

辛火

者胃怯也 有愈 取尿法用青蓮葉安龜在 若肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸並用龜尿點其骨節 失音此腎怯不能上接於陽也几口噤不止則失音語 失音吐寫或大便後雖有聲而不能言又能咽物者非 日或半年不內病而身黃者胃熱胎疸也若淡黃年白 便滋一身盡黄小便黃亦此黃疸也寫者難治 若大病後身目背黃者黄病也 長大不行行則脚軟 茜久不生生則不 身病背強大小 岩有

為等 是活在人同歸一大黃海路 雷歸人足厥陰以防 一海心大實龍胆草與益肝胆雷歸入足厥陰以防 一海心大實龍胆草與益肝胆雷歸入手足厥陰山栀 風各等 欽定四華全書 题 石為末娘家丸炎質大每服半九竹葉湯入砂糖化 髮久不生生則不黑皆胎弱 随臺執死 쿳

生犀散 尊赤散 五钱犀角云展角症後用以散餘毒無毒而血虚者地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾高兩一甘草地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾高兩一甘草 右為末每服一銭入淡竹葉像心水煎生地黄品與小本通我小馬之無故甘草各等分生地黄品與小馬之無故甘草生寫心大 右為末每服一二錢水煎 宜非

益黄散 一次定四車全書 一門 海黄散 五味異功散 藿香葉內手足太陰經甘草五分 石膏 月失 栀仁一两治胃防風三两 石用蜜酒微炒為末每服一二錢水煎 石為末安服三錢薑聚水煎 茯苓 治脾胃實熟 治脾土虚寒嘔吐泄泻 治脾胃虚弱吐瀉不食 白术 勘安班範 甘草炒 手た 陳皮

海白散 阿膠散 桑根白皮身沒者那有 能開胃消甘草致 石為末毎服一 石為末每服 青皮 再起炒能甘草等 治肺虚咳嗽口乾作渴 有餘者都有餘也地骨度各少好海肺氣之有餘也骨度各 治肺經實熱咳嗽痰喘 二錢入粳米百粒水煎 二錢水煎 陰官之倉 炙三 太 香料用中寒河子肉 馬兜 五錢主肺 敞清肺 炙五 执

一段定四車全書 题 地黄丸 肺 石地黄杆膏餘為末加煉蜜丸如桐子大每服二三 熟地黄 陰無汗之情然白茯苓入五葵牡丹皮中之火治足少白茯苓各三錢牡丹皮 石為末每服二錢水煎 两杏仁喘用治氣也 鼠粘子五分 水真陰補血虚山茱萸肉滿精乾山樂海陰八錢酒洗益腎山茱萸肉補腎丸 治腎虚解顧或行遲語遲等症 陶老歌乳 19

四物湯 四君子湯 甾歸 穢吐逆 右作二劑水煎服 十凡空心白湯送下 へ参 熟地黄路二白芍樂一致芳常五分 白茯苓 治氣血俱虛或因失血過多或因剋伐 治肝經血虚發熱日脯盖甚或煩燥不能 治脾氣虚弱飲食不化腸鳴泄渴或嘔 白术 甘草五分水煎服

設定四事全書 屋 十全大補湯 六君子湯 自汗盗汗食少體像或發熱作渴頭痛財運等症 氣以致內熱發熱肢體瘦瘁 思乳食或嘔吐泄泻飲食不化或時患飲食停滯或 即四物四君子二湯合服 母有前症致兒為患 八珍湯加黄於肉桂 治脾胃虚弱體瘦面黄或久患瘧痢不 治氣血虚熱或因病後惡寒發熱或 蘭麦軸範 型土

補中益氣湯 黄芪炙 甘草《各 感冒風寒諸症或乳母勞役發熱致兒為患 陳皮浴五升麻 右每服二三錢薑棗水煎 右七味加薑棗水煎 錢 白术 治中氣不足困睡發熱或元氣虚弱 柴胡洛二 白术炒 茯苓養二陳皮 甘草炙 當歸 半夏

肥兒九 改定四車全書 一 香砂助胃膏 我去胃少仁四月 黄連步 冯等症 右為末煉蜜九芡實大每服二三九米飲磨化 非比香附陳皮之歌泄也 記山樂一兩四箇根温中補牌下氣運化記樂一兩 白术炒 神翅炒 治食積五疳頭項結核髮稀成穗發熱作 氣消食 白豆蕊腹脾胃進食肉豆蔻四十粒下白豆蕊十四粒寬胃 治胃寒吐泻乳食不化 蘭達職東 白茯苓錢五甘草炙 木香五錢 抵押破滞氣內豆 型土

九味蘆薈九 造舊 憲三兩史君子 酒沒麥芽奶 右為末超糊光如麻子大母服三五十九米飲下良 右為末蒸餅糊丸如麻子大每服一二錢空心白湯 瘰癧結核耳內生瘡等症 久用五味與功散一服以助胃氣 青皮 胡肯連 白雷丸 治肝脾疳積體瘦熱渴大便不利或 黄連 鶴里草西 麝香三銭 木香 無美地

木香丸 次定四車全書 ! 胡黄連九 石為末填入猪胆内以線上 胡黄連 木香 石為末蜜丸如菜豆大每服三五丸煎薄荷湯下 青便 治冷疳 去油 與 存性 治熱疳 黄連錢 硃砂品鐵 蘭養歌範 肉豆蔻 行

順香散 如聖凡 史君子 服一二十九米飲下 沸取出研入蘆薈麝香各二錢飯和മ如麻子 参湯下 錢麝香五分乳販蟆五筒酒 右為末以蝦蟆膏杵丸麻子大毎服一二十九煎人 取肉胡黄連 治冷熱疳寫 治鼻疳赤爛 川黄連 白無夷好各

一跃定四車全書 一門 白粉散 蟾蜍丸 沿衛音葉先展銅青 右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投 些缺 大不跳 不鳴身多 編者 服瀉痢愈 石為末先用聚水洗拭乾貼 海螵蛸三分白芨二分輕粉一分 治無辜疳症一服虚熱退二服煩渴止三 冶锗疳瘡 蘭臺執死 輕粉分 為末乾貼 四十四

安虫散 一無美散 右為末每服五六分米飲下 白無夷 與蛆食一書一夜用布袋或蛆置急流中一宿取出九 胡粉炒黄槟榔 上焙乾為末入麝香一字粳米飯屯麻子大每服二 三十九米飲下其效如神 治虫動心痛 治虫動口內流涎 乾漆好谷 川練子 鶴虱姦三枯白蓉

炎至四事公野 一人 白玉散 仙方活命飲 柳華散 黄柏炒 消毒排腺止痛之聖藥也若膿出而腫痛不止者元 白土三錢寒水石五錢為末用米醋或新水調塗 右為末每服五六分痛時米飲調下 一錢 涌黄 治熱毒口瘡 治丹瘤 治一切瘡毒未成內消已成即潰此 蘭臺軌範 青黛 人中白紫谷為末數 四九

消積九 金がといたとうで 右每服二三錢酒水各半煎 錢各 穿山甲 石為末髮糊凡黍米大每服五七九温水下 丁香九粒縮砂村二巴豆二粒去鳥梅內三筒 東虚也當補之 赤芍藥 金銀花 治食積大便酸臭發熱 白芷 歸尾 陳皮谷三皂角刺二錢 防風 乳香 没禁 花粉 甘草 見母

四神九 保和凡 致足四庫全書 又 為患 **肉豆蔻二两補骨脂四兩五味子二兩呉茱萸一兩** 連翹 右為末用水二碗生薑八兩紅棗一百枚煮熟用聚 右為末粥糊九如桐子大每服一二十九白湯下 山雪二兩神麹二兩半夏 雜葡子發五 治脾肾禀虚泄瀉不食或乳母患此致兒 治食積 蘭臺鞭範 茯苓西 陳皮 四

白虎湯 五苓散 泽泻五或省谷 內和末九如麻子大每服二三十九空心食前白湯 右為末毎服一二錢白湯調下 知母五錢石膏四兩白粳米八錢甘草錢五 下子母並服 治傷暑煩燥身熱痰藏頭痛口燥大湯 治霍亂吐為燥渴飲水小便不利 官桂 赤茯苓 白术

改定四事全書 " **参**蘓飲 地黄清肺飲 足並冷喘促痰涎 阿勝一錢鼠粘子二分馬兜鈴 右每服 石為末每服 校去糯米十 一錢水煎則即前阿膠散 紫蘇 治感胃風寒或腹脹少食泄泻嘔吐或手 一十粒 治肺疳咳嗽痰唾稠粘 二錢水煎 蘭臺執死 陳皮 半憂 す矣 味否 甘草谷及古 四十七 茯苓

加味逍遥散 小柴胡湯 患 柴胡八錢半夏湯泊黃茶 肢順疼寒熱往來嘔吐痰實及治中暑病瘧 枳殼 麸炒桔梗炒 石每服一二錢薑棗水煎 个香三分為末每服一二錢水煎 治傷寒温熱患身熱惡風頭痛項強四 治乳母肝脾氣血虚弱發熱致兒為 前胡 乾葛 参發三甘草矣 甘草 **工**奶 於定四事全書 團 百陳湯 龍胆瀉肝湯 茵陳二錢 栀子二筒大黄二錢每服一錢水煎 服 龍胆草酒炒車前子炒 牡丹皮 甘草 治身熱算氧汗出二便赤溢濕熱發黃 白术 山栀炒 黄芩 治肝經濕熱或囊癰便毒小便 随喜軌範 甘草好谷水煎服 生地 芍藥炒黄谷柴胡 歸尾 山栀谷三水煎 四十八

黃連香衛飲 金匮加减腎氣丸 すりドラノニ **凶脾胃虚弱治失其宜元氣復傷而變者非此樂不** 或吐腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蟲者此症多 酒各一盏煎冷服 香薷四兩厚朴二兩黃連 右每服一二錢將朴連同生薑炒令紫色入香糯水 治脾腎虚腰重脚輕小便不利

決定四車全書 五色丸 硃砂 白茯苓三两附子兔五 石為末和地黄膏加煉蜜杵九如桐子大每服 南熟地黄四两指碎 **下丸空心米湯下** 結 車前子 治五癎 真珠鈴五水銀 山黄肉 開臺帆兒 雄黄錢 山樂 黑鉛三兩 牡丹皮 内され

福銀九 斷澗井 右為末煉蜜九麻子大每服三四九煎銀花海荷 黃溪 塞 多 對 膝 釣 石為末煮棗肉為九麻子大毎服五七九人 吳蟬 脱五首 牛黄一字 下 治癎差後變症不止 治風涎膈熱及乳食不消腹脹嗚促 答人 細平 甘草及我蛇退于

於定四軍全勢 小續命湯 利騰丸 香罗研 巴豆 右為末陳米粥九如菜豆大每服二三九煎淨荷 大空黄二錢輕粉 石為末蜜九豌豆大每藏服一九簿猗湯化下 . 五分 治急驚 水銀錢 京墨 **\*** 治中風不省人事涎鳴失音肢體反張 蘭臺牧乳 青黛名 黑奉牛钱五 五十

鈴藤釣飲 甘草炒 鉤藤鉤三分蟬蛻 右各另為末和匀每服一錢薑棗水煎有熟減挂附 分附子臍二錢 麻黄去節人參 或時 厥冷 杏仁去成漢防己 治吐利脾胃虧損虚風慢驚 防風炒 芎蓊 官桂各五防風 芍藥

百祥九 汉足四事全書 一尽 大青膏 浸焙味砂 紫五分 麝香る新為末毎服一 荷湯化下 紅牙大戟陰乾漿水煮軟去 右為末生蜜和膏每服一豆粒許月中兒用半粒簿 天麻 青黛路一白附子 治痘瘡黑陷及喉而吐青緑水 治傷風吐寫身温氣熱驚搐 骨復入原汁中煮 天竺黄二錢麝香二分 勘查執範 一二錢水煎 乳蝎去毒 烏稍蛇 <u> 주</u>

歸牌湯 雄黄散 牛李膏 湯化下 雄黄 牛李子一味杵汁石器內熱膏每服皂子大煎右膠 石焙乳為末水凡粟米大毎服十九赤芝麻湯送下 錢銅緑二錢同研細量瘡大小乾粽其上 白术 治乳母脾經氣鬱致兒為患 治痘後牙歐生疳蝕瘡 治痘瘡黑陷 茯神 黄 離眼肉

一段定四事全書 一 越鞠九 考衛 蒼术 右薑棗水煎服加柴胡山梔名加味歸脾湯 瘡疥等症 湯下子母並服 右為末水調神麹糊九桐子大每服二三十九白家 錢遠志一錢酸聚仁 神麹炒 麥芽炒各 治乳母六鬱傳兒為患或胸滿吐酸齒痛 高麦颗乳 香附子 木香 山查 甘草分三 车

安神九 蟬蜺釣籐散 花火膏 燈花一 麥門冬去心牙硝 右為末煉蜜九芡實大每服半凡砂糖水化下 類堂乳上令兒吮ご 治夜啼 甘草各五味砂一两龍路二分 天麻 治邪熱驚啼心肝壯熱面黃頰赤 治肚疼驚啼 茯苓 白茯苓 考虧 乹山樂 白芍薬 寒

一次をりまれら 一 止汗散 羚羊角丸 錢甘草 故蒲扇 銭五 白茯苓養五肉桂 石為末煉蜜凡每服一皂子大臼湯化下 把燒存性研為末每服三錢温酒調下 治睡而自汗 虎脛骨醋及生地黄焙 治行遲 蘭臺軌範 防風 銭燈心湯下 當歸 酸聚仁 五十二

團參湯 **商歸六黃湯** すりとうとう **罱歸** 陽氣脱陷急宜服之 右用猪心一片每服三錢水煎服 人参 黃連 當歸谷等 熟地黄 治禀赋不足上氣喘急自汗盜汗或病久 治心血虚熟自汗盗汗 生地黄分等每服二錢水煎服 治血虚不足虚火內動盜汗不止 黄茂炒 黄柏以下俱黄芩

飲定四車全書 一門 参養祭湯 當歸 白芍藥五分人参 11 人 遠志 五分每服二三錢薑東水煎 馬蛇內所沒白礬 少作寫或久病虚損口氧食少数而下痢驚熱自汗 一多五钱附子 白木奶 治胎肥胎熟胎怯 治脾肺俱虚發熱惡寒肢體瘦倦 随麦朝死 甘草民各熟地黄 陳皮 青黛各三天麻二錢蝎尾 錢薑水煎 黄茂蜜炙桂心 五百 五味子

神效當歸膏 保命敦每百治一切急驚慢驚痰涎湧塞手足抽搐目 直神昏夜啼畫像吐乳寫白種種惡症 告節 引即成膏矣以上背直此所載之方以 右先将當歸地黄入油煎黑去渣入蠟熔化候冷覺 右為末桃枝一握水煎浴之勿浴背 毒硫砂谷 麝香二分 黄蠟 治跌撲湯火等瘡不問己潰未潰 生地黄為一麻油六兩

一次定四車全書 一 服 湯下凡小兒有病即宜少與乳食若似驚風即宜斷 石為末和匀每服一二分或用神麹糊乃麻子大毎 蟬蜺炙 茯神義二天竺黄 研 二十九量兒大小加減釣藤 麝香各三 牛黄分三琥珀 五分胆星 天虫 天麻三錢全場片首酒樣石三錢水 前变玩玩 茯苓 定角 錢薄荷三分泡 甘草 支 白附子 防風 薄荷

治赤痛方 治疳積方 寒水石 後以空乳令吃否則乳下喉中即成頹痰雖神丹無 乳如欲食與米飲一 不落水雞肝酒洗同黄蠟一錢頓熟去蠟吃 致俟少安漸與乳可也 枯礬 黄柏 白墡粉 **匀必欲食乳類先將乳擠空然** 黄連 氷片 大黄 青黛 鉛粉

改定四車全書 治痘出眼中方 治骨蒸方 治瀬る 黄連 銀柴胡八分鮮骨皮 五錢枯罄五錢川椒二錢水片 取田雞胆點之愈 两蛇床子 五錢五格子 不拘頭面遍身痛癢黃水出俱效 Į. 研麻油調塗 衛養難花 錢真青萬 錢同研麻油調塗 兩輕粉三銭黄柏 爻 五分

治遺尿方知如 治牙疳方 根 看梅八分雄黄五分硼砂五分銅青三分 雞胜胜人具桑螵蛸三枚甘草美分黄流 人中白一我枯卷三分紅褐子存性 雞肫皮無錢 角五分丹皮五分甘草三分元参一錢竹葉二十 錢與為粗末每用一錢水一盛煎去渣服 兩水煎服 壮蠣

及宝四軍全事 一 治螳螂子方 治吐乳方新書 右同研細擦口內兩順吐出涎一日用四五次 青黛一錢元明粉三錢硼砂 蓮子心好收丁香三粒人参三分 右同研乳汁浸今兒吮食 右為末煎膿茶調搽吐出涎 即妬乳也 屬臺軌記 錢薄荷五分氷片 포

法以騙人取利強者幸愈弱者俱死惟松江蘇州最 如螳螂子者逐相信不疑死而不悔深可憐憫除蘇 受其害蓋小兒兩頥內外皮有兩層中空處有脂膜 用此方塗口亦易愈近日海濱妖婦造割螳螂子之 自古無螳螂子之病凡小兒愛蒸之候一每有口內微 腫惡乳之時名曰妬乳不治自愈其或不能坐視則 松之外天下並無有生螳螂子而死者斷不可為其 **地人人皆然割去復生妖婦以此惑人人見果有** 

淡毛四年全書 一 損 亦為廢人 所愚而受害力 小不同腰脊歪斜脊骨馬起俱屬不治或久而成毒 小兒股內無力因跌而起一足不伸臀左右 蘭臺軟乾

蘭臺軌範卷八		And the latest control of the latest control	Personal Co. 1 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	全まだく ピック ノニーリー
				巻へ